

DESINFEKTIONSPLAN für Kindereinrichtungen – Durchfall und Erbrechen –

Die Eltern aller Kinder sollten über die aufgetretene Durchfallerkrankung informiert werden. Das erkrankte Kind ist bis zur Abholung durch die Eltern möglichst getrennt von den übrigen Kindern zu betreuen. Die Person, die das erkrankte Kind betreut, sollte nicht in die Essenzubereitung und -verteilung eingebunden werden. Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt sind, dürfen eine Gemeinschaftseinrichtung nicht besuchen.

Noroviren sind bereits ab 2 Erkrankungen meldepflichtig gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Infektionsschutzgesetz.
Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflicht gem. § 34 Infektionsschutzgesetz.

	WAS	WANN	WOMIT	KONZENTRATION/ EINWIRKZEIT	WIE	WER	
 Haut/Hände	Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> Bei Arbeitsbeginn. Nach Kontakt mit erkrankten Kindern. Nach Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem. Nach Kontakt mit kontaminierten Gegenständen und Flächen. Am Arbeitsende. 	<input type="checkbox"/> ASEPTOMAN® VIRAL <input type="checkbox"/> ASEPTOMAN® PLUS	Konz. - 1 Min.	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel bis zur vollständigen Auftröcknung gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.	Alle Mitarbeiter	
 Flächen	Fieberthermometer	• Direkt nach Gebrauch.	<input type="checkbox"/> DESOMED® RAPID PUR <input type="checkbox"/> DESOMED RAPID PUR WIPES MAXI	Konz. - 3 Min.	Mit Desinfektionsmittel getränktem Einmaltuch vollständig abwischen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter	
	Spielzeug	• Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	<input type="checkbox"/> DESOMED® RAPID PUR <input type="checkbox"/> ULTRASOL® ACTIVE <input type="checkbox"/> DESOMED RAPID PUR WIPES MAXI	Konz. - 3 Min. 1 % - 60 Min. Konz. - 3 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Alle Mitarbeiter	
	Bällebad	Siehe http://www.ihph.de/vah-online/uploads/PDF/VAH_Baallebad_HM_1-2_17.pdf					
	Wickeltischauflage	• Nach Gebrauch.	<input type="checkbox"/> DESOMED® RAPID PUR <input type="checkbox"/> DESOMED RAPID PUR WIPES MAXI	Konz. - 3 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter	
	Alle Kontaktflächen, z. B. Türgriffe, Arbeitsflächen, Wickeltisch	• Täglich. • Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	<input type="checkbox"/> DESOMED® RAPID PUR <input type="checkbox"/> ULTRASOL® ACTIVE <input type="checkbox"/> DESOMED RAPID PUR WIPES MAXI	Konz. - 3 Min. 1 % - 60 Min. Konz. - 3 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter	
	Fußböden	• Täglich. • Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	<input type="checkbox"/> ULTRASOL® ACTIVE	1 % - 60 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter	
	Toilette, Waschbecken	• Täglich. • Nach jeder Toilettennutzung durch ein erkranktes Kind. • Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	<input type="checkbox"/> DESOMED® RAPID PUR <input type="checkbox"/> DESOMED RAPID PUR WIPES MAXI	Konz. - 3 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter	
In der Kombination ULTRASOL ACTIVE/D-Wipes beträgt die Standzeit maximal 8 Std.							
Sonstiges	Geschirr und Besteck	• Nach Benutzung.			Maschinelle Aufbereitung bei mindestens 60 °C.	Alle Mitarbeiter	
	Schutzkleidung: Flüssigkeitsdichte, ungepuderte, allergenarme und zusätzlich reinigungs- und desinfektionsmittelbeständige Schutzhandschuhe (DIN EN 420 und DIN EN 374) mit verlängertem Schaft zum Stulpen. Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch (DIN EN 455 Teil 1-4) PE-Schürze	<ul style="list-style-type: none"> Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten. Beim Umgang mit Ausscheidungen, Blut und Erbrochenem. Falls die Arbeitskleidung durchnässt oder kontaminiert werden kann 			Einmalhandschuhe nach Gebrauch entsorgen. Nach Gebrauch entsorgen. Nach Gebrauch entsorgen.	Alle Mitarbeiter	

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im D-WIPES Spendersystem eingesetzt werden. Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten. Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen. Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen aufgrund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Instituts (§18 IfSG) anzuwenden (Hände: ASEPTOMAN VIRAL, Flächen: ULTRASOL ACTIVE). Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.