

### Hände und Haut

	Was	Wann	Womit (Konzentration/Einwirkzeit)	Wie	Wer
Hände- und Haut- desinfektion	Händedesinfektion hygienisch	<ul> <li>Vor und nach Kontakt mit betreuten Personen.</li> <li>Vor aseptischen Tätigkeiten.</li> <li>Nach Kontakt mit (potenziell) infektiösem Materialien/Oberflächen.</li> <li>Nach Kontakt zu Oberflächen in der unmittelbaren Umgebung betreuter Personen.</li> <li>Vor jedem Anlegen und nach jedem Ablegen von PSA inkl. Schutzhandschuhen.</li> <li>Vor dem Umgang mit Lebensmitteln.</li> </ul>		Händedesinfektionsmittel in trockene, hohle Hände geben und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten, ggf. nachbenetzen. Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze besonders beachten. Unterarme bei Kontamination mit desinfizieren.  Hinweise bei Verschmutzung: Zuerst mechanisch reinigen (mit Wasser abspülen oder mit einem sauberen, trockenen Einmaltuch), danach desinfizieren.	Alle Mitarbeitende
	Hautdesinfektion			Hautstelle satt benetzen, ggf mit sterilem Tupfer abreiben, erneut benetzen. Alternativ: Mit sterilem, getränktem Tupfer gleichmäßig abreiben. Einwirkzeit einhalten, nicht trocken reiben.	
	Schleimhaut- Antisepsis	<ul> <li>Vor invasiven Maßnahmen im Bereich der Schleimhäute, z. B. Katheterisierung, Absau- gung, endotracheale Intubation, Mundpflege bei immungeschwächten Personen.</li> <li>Nach ärztlicher Verordnung, z. B. im Rahmen der täglichen Mundpflege und vor bestimmten therapeutischen Anwendungen.</li> </ul>		Schleimhaut inspizieren. Antiseptikum einmalig gezielt mit sterilem Tupfer/Applikator auftragen. Augenkontakt vermeiden. Einwirkzeit laut Hersteller be- achten. Nicht abwischen, außer medizinisch erforderlich.	



### Fläche

	Was	Wann	Womit (Konzentration/Einwirkzeit)	Wie	Wer
Fläche	Arbeitsflächen für aseptische Tätigkeiten	· Vor jeder Nutzung.		Flächen vollständig mit desinfektionmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	
	Häufig berührte sowie personennahe Flächen	<ul><li>Täglich.</li><li>Sofort bei Kontamination.</li></ul>		Flächen vollständig mit desinfektionmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	
	Selten berührte Flächen von Mobiliar sowie Ausstattung	· Sofort bei Kontamination.		Flächen vollständig mit desinfektionmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	
	Empfindliche Oberflächen (Mobiliar, Technik, Ausstattung)	• Sofort bei Kontamination.		Aufbereitungshinweise der Hersteller und Materialverträglichkeiten beachten! Bei elektrischen Pflegehilfsmitteln/Geräten spannungslosen Zustand sicherstellen. Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	
	Medikamenten(kühl)- schrank	<ul> <li>Kontaktflächen außen: Täglich und sofort bei Kontamination.</li> <li>Innenraum: Sofort bei Kontamination.</li> </ul>		Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	



### Fläche

	Was	Wann	Womit (Konzentration/Einwirkzeit)	Wie	Wer
Fläche	Hilfsmittel zur Pflege, Mobilisation und Therapie	<ul> <li>Personenbezogen: Sofort bei Kontamination und vor Weitergabe an andere Personen.</li> <li>Personenübergreifend: Sofort nach Gebrauch und sofort bei Kontamination.</li> <li>Sonstige Intervalle für Hilfsmittel zur Mobilisation: Vor Reparatur oder Rückgabe.</li> </ul>		Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.  Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.	
	Steckbecken, Urinflaschen, Toiletteneimer	• Sofort nach Gebrauch.		Maschinelle Aufbereitung gemäß Herstellerangaben. Bei sichtbaren Rückständen -> Aufbereitung erneut wiederholen.  Bei Nichterreichen des A0-Wertes sowie bei Infektionsausbrüchen (z. B. Norovirus, Clostridioides difficile): zusätzliche manuelle Flächendesinfektion mit einem Präparat mit angepasstem Wirkungsspektrum (z. B. begrenzt viruzid PLUS, viruzid, sporizid).	
	Sanitärobjekte und angrenzende Flächen (Wasch-/ Ausgussbecken inkl. Armaturen, Toiletten)	Sofort bei Kontamination.     Bei Verdacht oder Vorliegen von Infektionskrankheiten zusätzlich nach jeder Nutzung.		Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.  Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.	
	Spender (Händehygiene)	<ul> <li>Bedienhebel: Täglich und sofort bei Kontamiantion.</li> <li>Äußere Gehäuse und alle von außen zugänglichen Teile: Wöchentlich und sofort bei Kontamination.</li> </ul>		Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.  Vollständige Spenderaufbereitung erfolgt gemäß der Aufbereitungshinweise von den Herstellern der Spendersysteme.	



### Fläche

	Was	Wann	Womit (Konzentration/Einwirkzeit)	Wie	Wer
Fläche	Reinigungsutensilien	Täglich am Ende des Desinfektions-/ Reinigungseinsatzes. Sofort bei Kontamination.		Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Textile Reinigungsutensilien in geeigneten, gekennzeichneten Behältnissen sammeln und der hygienischen Aufbereitung (desinfizierendes Waschverfahren) zuführen.  Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – Bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.	
	Abfallbehälter	<ul><li>Täglich nach Entleerung.</li><li>Sofort bei Kontamination.</li></ul>		Flächen vollständig mit desinfektionmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	
	Fußboden & Barfußbereiche	Fußboden:  - Sofort bei Kontamination Nach Risikobewertung und hygienischer Anweisung.  Barfußbereiche (z. B. Bad, Dusche) - Sofort bei Kontamination.		Fußboden systematisch im S-Muster wischen. Für jeden Raum oder Bereich frischen Bezug verwenden (Bezugs-Wechselmethode). Flächen über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	
	Schlussdesinfektion	<ul> <li>Nach Verlegung oder Entlassung von zu betreuten Personen.</li> <li>Vor Nutzung durch andere zu betreuende Personen.</li> <li>Nach Ende des festgestellten Ausbruchsgeschehen: siehe Plan "Spezielle Maßnahmen".</li> </ul>		Die Durchführung der Flächendesinfektion aller personennaher Flächen inkl. Bett, Möbel, Pflegehilfsmittel, Fußboden und Sanitärbereich erfolgt gemäß den im Plan festgelegten Vorgaben der einzelnen Kategorien zur jeweiligen Fläche.  Kissen und Decken der hygienischen Aufbereitung (desinfizierendes Waschverfahren) zuführen. Matratzenschutzbezug (flüssigkeitsdicht) desinfizierend reinigen.	



## Sonstiges

	Was	Wann	Womit (Konzentration/Einwirkzeit)	Wie	Wer
Sonstiges	Geschirr	• Sofort nach Gebrauch.	Spülmaschine, thermische Desinfektion Programm bei > 65°C	Geschirr unverzüglich in geschlossenen Transportsystemen (ggf. mit Deckel abdecken) zur Spülmaschine transportieren und hygienisch aufbereiten.	



Sonstiges

### Allgemeine Hinweise

#### Wiederbenutzung von Flächen (RKI):

- · Routinemäßige Desinfektion: Nutzung, sobald die Fläche sichtbar trocken ist.
- Gezielte Desinfektion (z. B. nach Kontamination, vor aseptischen Tätigkeiten, bei speziellen Erregern, Schlussdesinfektion, Desinfektion von Flächen mit nachträglicher Trinkwasserspülung):
  Einwirkzeit laut Herstellerangaben vollständig abwarten.

#### Sicherheit:

- · Desinfektionsmittel gemäß Herstellerangaben verwenden Materialverträglichkeiten prüfen.
- · Geeignete Schutzausrüstung (PSA) tragen.
- · Vor der Desinfektion sichtbare Verschmutzungen mit einem Einmaltuch entfernen (Eiweißfixierung vermeiden).
- · Kontaktflächen mit Lebensmitteln oder Haut nach der Desinfektion sofern vom Desinfektionsmittelhersteller vorgesehen mit Trinkwasser spülen.

#### **Grundlage:**

• Der Desinfektionsplan wurde auf Grundlage der RKI-/KRINKO-Empfehlungen und der TRBA 250 erstellt und unfasst die routinemäßige Desinfektion mit einem Wirkungsspektrum einschließlich "begrenzt viruzid PLUS" (Wirksamkeit gegen behüllte Viren sowie zusätzlich bestimmte unbehüllte Viren (Noro-, Rota- und Adenoviren)).

#### **Wichtiger Hinweis:**

• Bei Verdacht oder bestätigten Infektionskrankheiten sind ergänzend die im Plan: "Spezielle Maßnahmen …" aufgeführten Regelungen zu berücksichtigen und anzuwenden.

#### **Verantwortung:**

- Die Verantwortung für die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.
- Es ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Desinfektionsmittel dem erforderlichen Wirkungsspektrum entsprechen und ordnungsgemäß angewendet werden.