

Desinfektionsplan Tagespflege (einschließlich Noro-, Rota-, Adenoviren)

Hände und Haut/Fläche

	Was	Wann	Womit (Konzentration/Einwirkzeit)	Wie	Wer
 Hände- und Haut-desinfektion	Händedesinfektion hygienisch	• Vor und nach Kontakt mit betreuten Personen. • Vor aseptischen Tätigkeiten. • Nach Kontakt mit (potenziell) infektiösem Materialien/Oberflächen. • Nach Kontakt zu Oberflächen in der unmittelbaren Umgebung betreuter Personen. • Vor jedem Anlegen und nach jedem Ablegen von PSA inkl. Schutzhandschuhen. • Vor dem Umgang mit Lebensmitteln.	_____	Händedesinfektionsmittel in trockene, hohle Hände geben und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten, ggf. nachbenetzen. Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze besonders beachten. Unterarme bei Kontamination mit desinfizieren. Hinweise bei Verschmutzung: Zuerst mechanisch reinigen (mit Wasser abspülen oder mit einem sauberen, trockenen Einmaltuch), danach desinfizieren.	Alle Mitarbeitende _____ _____ _____
	Arbeitsflächen für aseptische Tätigkeiten	• Vor jeder Nutzung.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
	Häufig berührte sowie personennahe Flächen	• Täglich. • Sofort bei Kontamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
 Fläche	Selten berührte Flächen von Mobiliar sowie Ausstattung	• Sofort bei Kontamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____

Desinfektionsplan Tagespflege (einschließlich Noro-, Rota-, Adenoviren)

Fläche

Was	Wann	Womit (Konzentration/Einwirkzeit)	Wie	Wer
 Fläche Empfindliche Oberflächen (Mobiliar, Technik, Ausstattung)	• Sofort bei Kontamination.		Aufbereitungshinweise der Hersteller und Materialverträglichkeiten beachten! Bei elektrischen Pflegehilfsmitteln/Geräten spannungslosen Zustand sicherstellen. Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	
Hilfsmittel zur Pflege, Mobilisation und Therapie	• Sofort nach Gebrauch bzw. Weitergabe an andere Personen. • Sofort bei Kontamination.		Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.	
Sanitärobjekte und angrenzende Flächen (Wasch-/Ausgussbecken inkl. Armaturen, Toiletten)	• Sofort bei Kontamination. • Bei Verdacht oder Vorliegen von Infektionskrankheiten zusätzlich nach jeder Nutzung.		Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.	
Spender (Händehygiene)	• Bedienhebel: Täglich und sofort bei Kontamination. • Äußere Gehäuse und alle von außen zugänglichen Teile: Wöchentlich und sofort bei Kontamination.		Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Vollständige Spenderaufbereitung erfolgt gemäß der Aufbereitungshinweise von den Herstellern der Spendersysteme.	

Desinfektionsplan Tagespflege (einschließlich Noro-, Rota-, Adenoviren)

Fläche

	Was	Wann	Womit (Konzentration/Einwirkzeit)	Wie	Wer
 Fläche	Reinigungsutensilien	• Täglich am Ende des Desinfektions-/Reinigungseinsatzes. • Sofort bei Kontamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Textile Reinigungsutensilien in geeigneten, gekennzeichneten Behältnissen sammeln und der hygienischen Aufbereitung (desinfizieren-des Waschverfahren) zuführen. Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – Bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.	_____ _____ _____ _____
	Abfallbehälter	• Täglich nach Entleerung. • Sofort bei Kontamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____ _____
	Fußboden	• Täglich nach Einrichtungsschluss. • Sofort bei Kontamination.	_____	Fußboden systematisch im S-Muster wischen. Für jeden Raum oder Bereich frischen Bezug verwenden (Bezugs-Wechselmethode). Flächen über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____ _____

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsplan Tagespflege (einschließlich Noro-, Rota-, Adenoviren)

Sonstiges

Allgemeine Hinweise

Wiederbenutzung von Flächen (RKI):

- **Routinemäßige Desinfektion:** Nutzung, sobald die Fläche sichtbar trocken ist.
- **Gezielte Desinfektion (z. B. nach Kontamination, vor aseptischen Tätigkeiten, bei speziellen Erregern, Schlussdesinfektion, Desinfektion von Flächen mit nachträglicher Trinkwasserspülung):** Einwirkzeit laut Herstellerangaben vollständig abwarten.

Sicherheit:

- Desinfektionsmittel gemäß Herstellerangaben verwenden – Materialverträglichkeiten prüfen.
- Geeignete Schutzausrüstung (PSA) tragen.
- Vor der Desinfektion sichtbare Verschmutzungen mit einem Einmaltuch entfernen (Eiweißfixierung vermeiden).
- Kontaktflächen mit Lebensmitteln oder Haut nach der Desinfektion – sofern vom Desinfektionsmittelhersteller vorgesehen – mit Trinkwasser spülen.

Grundlage:

- Der Desinfektionsplan wurde auf Grundlage der RKI-/KRINKO-Empfehlungen und der TRBA 250 erstellt und umfasst die routinemäßige Desinfektion mit einem Wirkungsspektrum einschließlich „begrenzt viruzid PLUS“ (Wirksamkeit gegen behüllte Viren sowie zusätzlich bestimmte unbehüllte Viren (Noro-, Rota- und Adenoviren)).

Wichtiger Hinweis:

- Bei Verdacht oder bestätigten Infektionskrankheiten sind ergänzend die im Plan: „Spezielle Maßnahmen ...“ aufgeführten Regelungen zu berücksichtigen und anzuwenden.

Verantwortung:

- Die Verantwortung für die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.
- Es ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Desinfektionsmittel dem erforderlichen Wirkungsspektrum entsprechen und ordnungsgemäß angewendet werden.